

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

קרא /י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

אקמולי פורטה®

פתילות לילדים

הרכב

כל פתילה מכילה:
Paracetamol 250 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Witepsol W-35 , Witepsol E-76

קבוצה תרופתית

אנלגטי, אנטיפירטי.

פעילות רפואית

משכך כאבים ומוריד חום.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לפראצטמול או לאחד ממרכיביה.

אם הינך בהריון או מניקה (בשימוש במבוגרים) או

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

אם הילד/ה סובל/ת או סבל/ה בעבר מליקוי בתיפקוד הכבד, הכליה/מערכת השתן, מאלכוהוליזם (בשימוש במבוגרים) או מזהבת וירלית.

אזהרות

פרצטמול עלול לגרום לנזק בכבד כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ, או לתקופה ממושכת, או כאשר בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים, או נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד. אין לתת תרופה זו לעיתים קרובות מבלי להיוועץ ברופא. יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום. אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכור כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח- למניעת מינון יתר/הרעלה של פרצטמול. אין לצרוך אלכוהול או תרופות המכילות אלכוהול בזמן השימוש בתרופה. אם הילד/ה רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. שימוש בילדים עד גיל 6 שנים רק בהתאם להוראת הרופא.

תגובות בין-תרופתיות

אם הילד/ה נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרה/ה זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם רופא או תוספי תזונה, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד קרישת דם, תרופות נוספות בעלות פעילות משככת כאבים וכן תכשירים נוגדי דלקת (בשימוש ממושך), מטוקלופראמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאה, ובעיות קיבה אחרות), כולסטרמיין (להפחתת יתר שומני הדם), או תכשירים המזרזים פעילות אנזימי הכבד כגון ברביטורטים, פניטואין (לעוויתות) או קרבמזפין, אנטיביוטיקה מסוג ריפמפיצין וכלורמפניקול או פרובנציד (לטיפול בשגדון). אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: אדמומית או כאב באזור פי הטבעת.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

סימנים של אלרגיה (פריחה או גרוד בעור) (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.

תופעות הנובעות ממינון יתר

שילשול, בחילה, הקאה, אובדן תיאבון כאבי בטן, נפיחות, כאב או רגישות בבטן עליונה (נדיר): יש להפסיק נטילת התרופה ולפנות לרופא מיד!

בכל מקרה שהילד/ה מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתו/ה הכללית, על ההורה להתייעץ עם הרופא.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה. ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון

בהעדר הוראה אחרת מהרופא, המינון המומלץ הוא:
ילדים עד גיל 6 שנים: בהתאם להוראת הרופא.
ילדים בגיל 6-12 שנים: 2-1 פתילות, 4-5 פעמים ביום.
מבוגרים: 2 פתילות, 4 - 5 פעמים ביום.
אין לעבור על המינון המומלץ.

אם החום נמשך למעלה מ-3 ימים או אם לא היתה הקלה בכאבים תוך 5 ימים יש לפנות לרופא.
אם בטעות קיבל הילד מנה כפולה, יש להתייעץ מיידית עם הרופא או לפנות לחדר מיון.

הוראות השימוש

לשימוש חיצוני בלבד.

רחץ/י היטב את ידיך. הפרד/י פתילה אחת מסרט הפתילות.

להסרת העטיפה- הפרד/י הלשוניות בחלק השטוח של העטיפה. השכב/י את הילד על צידו והחדר/י הפתילה עמוק לתוך פי הטבעת בעזרת האצבע. רחץ/י היטב את ידיך.

הערה! אם הפתילה רכה מדי, ניתן לצננה במקרר במשך כ-30 דקות או לצננה תחת זרם מים קרים לפני הסרת העטיפה.

מנעי הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא/י אריזת התרופה איתך.

אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נותן/ת לילד תרופה.

הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור תרופה זו מתחת ל-25°C.

גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר!
בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס.רישום התרופה: 122 20 30214 00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,

ת"ד 3190, פתח-תקוה