

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

קרא / בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

אקמולי®

סירופ ללא סוכר בטעם פירות

הרכב

כל 5 מ"ל מכילים:

Paracetamol 125 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Glycerin, sorbitol, povidone, sodium cyclamate, flavour tutti frutti, flavour vanilla, methylparaben, saccharin sodium, colour carmoisine, colour Blue FDC No.2, sodium hydroxide, purified water.

כל 5 מ"ל מכילים 2.5 מ"ג נתרן.

פעילות רפואית

משכך כאבים ומוריד חום.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

אם הינך בהריון/מניקה או אם את/ה או ילדך

סובל/ת או סבל/ה בעבר מליקוי בתיפקוד הכבד או הכליה/מערכת השתן, אלכוהוליזם או מצהבת.

אזהרות

פרצטאמול עלול לגרום לנזק בכבד במקרים האלה: כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ, ניתן לתקופה ממושכת, שותים משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול, כשנוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד. אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא. אם את/ה או ילדך רגישה/למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. יש להיוועץ ברופא בעת השימוש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 3 שנים. יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום. אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח-למניעת מינון יתר/הרעלה של פרצטאמול.

תגובות בין-תרופתיות

אם את/ה או ילדך נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמר/ת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה, לשינה, לאפילפסיה), תרופות נגד קרישת דם, תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, מטוכולופראמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאה, ובעיות קיבה אחרות), כולסטרמיין (להפחתת יתר שומני הדם), או תכשירים הממריצים יצור אנזימים בכבד כגון ברביטורטים או פניטואין או קרבמזפין, אנטיביוטיקות (כגון ריפמפיצין או כלורמפניקול), פרובנציד (לטיפול בשיגדון).

אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון פריחה, גירויים או סחרחורת.

תופעות המחייבות הציחסות מיוחדת

סימנים של שינויים במערכת הדם כגון דימומים, חבורות או פיתוח דלקות ביתר קלות (נדיר): הפסק/י טיפול ופנה/י לרופא מיד! תגובות אלרגיות כגון פריחה וגרד או לעיתים נדירות התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון ו/או הגפיים אשר עלולים לגרום לקשיי נשימה או בליעה (נדיר): הפסק/י טיפול ופנה/י לרופא מיד!

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת הנובעות בדרך כלל ממינון יתר

שילשול, בחילה, הקאה, אובדן תיאבון, כאבי בטן, נפיחות, כאב או רגישות בבטן עליונה (נדיר): יש להפסיק נטילת התרופה ולפנות לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשה הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים ובתינוקות

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה. ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון

בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

ילדים

מצא/י את המינון המתאים בטבלאות.

אם ידוע לך משקל הילד - יש לתת את המינון כפי שמופיע בטבלת המשקל המציינת מינון לפי משקל.

רק במקרה שלא ידוע משקל הילד - יקבע המינון על פי הגיל כפי שמופיע בטבלת הגיל המציינת מינון לפי גיל הילד.

טבלת משקל

משקל הילד	מנה במיליגרמים	מספר מנות מקסימלי ליממה
3 ק"ג	1.8	עד 5 פעמים ביממה
4 ק"ג	2.4	עד 5 פעמים ביממה
5 ק"ג	3.0	עד 5 פעמים ביממה
6 ק"ג	3.6	עד 5 פעמים ביממה
7 ק"ג	4.2	עד 5 פעמים ביממה
8 ק"ג	4.8	עד 5 פעמים ביממה
9 ק"ג	5.4	עד 5 פעמים ביממה
10 ק"ג	6.0	עד 5 פעמים ביממה
11 ק"ג	6.6	עד 5 פעמים ביממה
12 ק"ג	7.2	עד 5 פעמים ביממה
13 ק"ג	7.8	עד 5 פעמים ביממה
14 ק"ג	8.4	עד 5 פעמים ביממה
15 ק"ג	9.0	עד 5 פעמים ביממה
16 ק"ג	9.6	עד 5 פעמים ביממה
17 ק"ג	10.2	עד 5 פעמים ביממה
18 ק"ג	10.8	עד 5 פעמים ביממה
19 ק"ג	11.4	עד 5 פעמים ביממה
20 ק"ג	12.0	עד 5 פעמים ביממה

טבלת גיל

ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי. לכן יש לעשות מאמץ ולברר את משקל הילד/ה ולקבוע מינון לפי טבלת המשקל. רק אם אין אפשרות לברר את משקל הילד/ה ניתן לקבוע מינון לפי טבלה זו.

גיל הילד	מנה במיליגרמים	מספר מנות מקסימלי ליממה
3-0 חודשים	1.6	עד 5 פעמים ביממה
4-11 חודשים	3.2	עד 5 פעמים ביממה
12 - 23 חודשים	4.8	עד 5 פעמים ביממה
2-3 שנים	6.4	עד 5 פעמים ביממה
4-5 שנים	9.6	עד 5 פעמים ביממה
6-8 שנים	12.8	עד 5 פעמים ביממה
9-10 שנים	16.0	עד 5 פעמים ביממה
11 שנים	19.2	עד 5 פעמים ביממה

אין לעבור על המנה המומלצת או על מספר המנות ביממה

יש ליטול/לתת המנות במרווחים של לא פחות מ- 4 שעות.

ילדים מעל גיל 12 שנים:

20 מ"ל כל 5-4 שעות, לפי הצורך. אין לעבור על המנה המומלצת.

מבוגרים: 20 מ"ל כל 5-4 שעות, לפי הצורך. אין לעבור על 4 גרם של פרצטאמול (המצוי ב- 160 מ"ל סירופ) במשך 24 שעות.

אם החום נמשך למעלה מ- 3 ימים או אם לא היתה הקלה בכאבים תוך 5 ימים יש לפנות לרופא.

אם הילד/ה נטלה בטעות מנה כפולה, יש להיוועץ ברופא או לפנות לחדר מיון.

אופן השימוש

יש להשתמש במזרק המצורף לשם דיוק במינון. כל שנתה (קו) במזרק מודדת 0.1 מ"ל. כדי למדוד את הכמות הרצויה במזרק יש להכניס את גוף המזרק לבקבוק ביד אחת וביד השנייה למשוך את הטובלן (הבוכנה) כלפי מעלה, עד שתוכלי לקרוא את הכמות הרצויה בחלקו העליון של הטובלן (הבוכנה).
יש להכניס את המזרק לפי הילד לכיוון הלחי ולהזליף את תכולתו לאט.
לאחר השימוש יש להפריד את חלקי המזרק ולשטוף במים פושרים וסבון.

מנעי/ הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/י אריזת התרופה איתך.

אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטלת/ת או נותנת/ת לילד תרופה. הרכבי/ משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור תרופה זו מתחת ל 25°C . אין לאחסן במקרר.

גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס. רישום התרופה: 060 58 27436 00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,
ת"ד 3190, פתח-תקוה.