

אקמול פוקוס קפליית

הרכב

כל קפליה מכילה:

Acetylsalicylic acid	250 mg
Paracetamol	250 mg
Caffeine anhydrous	65 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Microcrystalline cellulose, stearic acid, crospovidone, silicon dioxide, hydroxypropyl methylcellulose, FD&C red #40, FD&C yellow #6, polyethylene glycol 400, titanium dioxide, polysorbate 80, purified water.

פעילות רפואית

משכך כאבים במצבים כגון: מיגרנה, כאב ראש, דלקת בסינוסים, הצטננות, כאב שרירים, כאבי וסת, כאבי שיניים, כאבים שיגרונים קלים וכאבים המלווים בחום.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מניקה.
אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה או לתכשירים אחרים אנטידלקטיים אשר אינם סטרואידים.
אין להשתמש בתרופה אם הינך סובלת/מכיב קיבה מדמם, דימומים, המופיליה, שגדון, בעיות בקיבה (כיב פפטי פעיל) או מאסטמה משולבת עם פוליפים באף.
אין להשתמש בתרופה בילדים ומתבגרים עד גיל 20 במחלות המלוות בחום דוגמת: שפעת או אבעבועות רוח (מתוך חשש לתיסמונת ריי - Reye's syndrome).
אין להשתמש בתכשיר אם לאחר נטילת משכך כאבים או תרופה להורדת חום סבלת אי פעם מהתופעות הבאות: אורטיקריה (פריחה בצקתית), נפיחות של הפנים, אסטמה, הלם.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך סובלת/או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד מערכת הנשימה (כגון אסטמה), פוליפים באף, הלב ו/או כלי דם (כגון הפרעות קצב, יתר לחץ דם), הכבד, הכליה, מערכת העיכול (כגון אולקוס), מערכת הדם (כגון קרישה וכו'), אם הינך סובלת/מהתמכרות לאלכוהול. אם הינך סובל מכאבי ראש באופן יומיומי, אם הינך סובל מכאב ראש שונה או חמור מהרגיל, אם כאב הראש נגרם על ידי חבלה, שיעול או התכופות, אם הינך מעל גיל 50 וחווה כאב ראש בפעם הראשונה ו/או אם כאב הראש שלך מלווה בהקאות, חום ו/או קשיון צווארי.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

אזהרות

תכשיר זה מכיל אספירין אשר כמו תכשירים אחרים השייכים לקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAID's) עלול להגביר את הסיכון לדימום בקיבה במיוחד במקרים הנ"ל: באנשים הנוטלים בו-זמנית תרופות לדילול דם, סטרואידים ותרופות NSAID's אחרות, בשימוש ממושך בתכשיר ובצריכת אלכוהול.
תכשיר זה מכיל פרצטאמול אשר עלול לגרום לנזק בכבד במקרים האלה: כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ, ניתן לתקופה ממושכת, שותים משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול, כשנוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.
אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח- למניעת מינון יתר/הרעלה של פרצטאמול.
יש להגביל את צריכת הקפאין בזמן הטיפול.
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
התכשיר עלול להפריע לתוצאות של בדיקת סוכר בדם.
אין ליטול תרופה זו 7 ימים לפני כל ניתוח.
אין להשתמש בתרופה במתבגרים ובילדים מתחת לגיל 12 ללא התייעצות עם רופא.
אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים ללא התייעצות עם רופא.

תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים

או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד קרישת דם (כגון וורפרין או קלופידוגרל), פרובנציד (לשגדון), מטוכולופראמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאה ובעיות קיבה אחרות), כולסטיראמין (להפחתת יתר שומני הדם), תרופות אשר מזרזות פעילות אנזימי כבד כגון: ברביטורטים או פניטואין (לעזימות), מטוטרקסט, תרופות נגד סכרת, זידובודין (לאיידס), תרופות נוספות בעלות פעולה משככת כאבים ונוגדי דלקות, תרופות המשפיעות על חומציות השתן, קורטיקוסטרואידים, תרופות להורדת לחץ דם (כגון מעכבי ACE), נוגדי

דיכאון או חרדה (כגון קבוצת SSRI), סותרת חומצה, תרופות לטיפול באסטמה (כגון תיאופילין), משתנים (כגון פורסמיד).

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: בחילה, גירוי בקיבה, כאב בטן, צרבת, כאב בטן קל.

תופעות (הנובעות בדרך כלל ממינון יתר) המחייבות התייחסות מיוחדת

דימומים, חבורות או פיתוח דלקות ביתר קלות, עצבנות, נידודי שינה: פנה/י לרופא.
תגובה אלרגית (פריחה, גירוד בעור, אודם, נפיחות בפנים, שפתיים, לשון ו/או גרון), קוצר או קשיי נשימה, צואה דמית או שחורה, עייפות או חולשה מוגברת, כאבים עזים בקיבה, סחרחורת, התעלפות, הקאות חמורות דמיות או דמויות גרגירי קפה: הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.
רעד, אי-שקט, חרדה, זמזומים באזניים, בעיות שמיעה, שינויים בקצב הלב, עוויתות, אובדן תיאבון, הזעה מוגברת, שתן כהה, שינויים בהטלת השתן, הצהבת העיניים ו/או העור: הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא

למבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 2 קפלויות כל 6 שעות
אין ליטול יותר מ- 8 קפלויות ב- 24 שעות
אין ליטול התרופה מעבר ל- 48 שעות למיגרנה
אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל למתבגרים וילדים מתחת לגיל 12 שנים
אם החום נמשך למעלה מ-3 ימים או אם לא היתה הקלה בכאבים תוך 5 ימים יש לפנות לרופא.

אופן השימוש

אין ללעוס! לבלוע התרופה עם כוס מים מלאה.
יש ליטול התרופה אחרי ארוחה.
אין לשכב 15-30 דקות לאחר נטילת התרופה.
אין לחצות או לכתוש את התרופה.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.
אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

לשמור תרופה זו במקום יבש מתחת ל 25°C .
יש להשאיר את סופח הלחות בתוך המיכל ולסגור היטב את המיכל לאחר כל שימוש.
גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 131 35 30995 00

131 35 30995 11

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,
ת"ד 3190, פתח תקוה