

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר ביולי 2010.

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו-1986**

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

היפוטירס E טיפות עיניים – מיכלים חד פעמים

הרכב:

Polyvidone 20 mg/0.4 ml (50 mg/ml)

חומרים בלתי פעילים:

Sodium Chloride, Boric Acid, Potassium Chloride, Sodium Lactate, Magnesium Chloride, Calcium Chloride, Sodium Hydroxide for pH adjustment, Water for Injection.

התכשיר אינו מכיל חומר משמר.

קבוצה תרופטית:

לובריקנט

טיפות היפוטירס מסייעות בהקלה על יובש בעין הנגרם לדוגמה עקב הרכבת עדשות מגע, עשן, רוח, ישיבה ממושכת מול מחשב או גירויים אחרים. הטיפות מרטיבות ומסככות את שטח פני העין.

פעילות רפואית:

התרופה מיועדת להקלת יובש בעין.

מתי אין להתשמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון או מיניקה.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

מתן טיפות עיניים עלול לגרום לטשטוש ראייה זמני ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ראייה תקינה. במקרה של טשטוש ראייה, יש להמתין עד לחזרתה של ראייה תקינה.

אזהרות:

אם הנך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין-תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. אם הנך משתמש/ת בתרופה נוספת לעין, עליך לעשות הפסקה של 5 דקות בין תרופה לתרופה והשתמש/י בהיפוטירס בסוף.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון צריבה קלה וזמנית בעין, הרגשת דביקות בעפעפיים או טישטוש ראייה.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

גירוי או תגובה של רגישות יתר (נדיר מאוד): הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא.
בכל מקרה שבו הינך מרגישה/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!
ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרות מרופא:

טיפה אחת לתוך שק הלחמית 4 פעמים ביום או לפי הצורך.
נפח מיכל חד פעמי מספיק לשימוש לשתי העיניים.
יש להשליך את המיכל מיד לאחר השימוש. אין לשמור מיכלים חד פעמיים לאחר השימוש בהם.
טיפות היפוטירס מכילות תמיסה סטרילית עד לשבירת הסוגר של המיכל. למניעת זיהום התמיסה יש להקפיד שקצה המיכל לא יבוא במגע עם משטח כלשהו. למניעת פגיעה בעין – יש להקפיד שקצה המיכל לא יבוא במגע עם העין.
אין לעבור על המנה המומלצת.
אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים יש לפנות לרופא.
קשישים: אין צורך בהתאמת המינון.
ילדים: לא נעשו מחקרים על שימוש בהיפוטירס בילדים.
שים לב:
לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש:

לפני השימוש יש לוודא כי אריזת המיכל סוגרה. לפתיחה סובב/י את המחלק העליון של המיכל והשתמש/י לפי המינון המומלץ. יש להשמיד את המיכל לאחר השימוש ואין לעשות בו שימוש חוזר מאחר והתכשיר אינו מכיל חומר משמר.
רחץ/י היטב את ידיך. הסרי/י את מכסה המיכל. הטה/י את ראשך לאחור, או שכב/י על מיטה ובעזרת האצבע הרחקה/י מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר טפטף/י טיפה של התרופה ועצום/י את העיניים למשך 1-2 דקות. על תעפעף/י. לאחר הכנסת הטיפה לעין מומלץ ללחוץ על הפינה פנימית של העין עם האצבע למשך 1-2 דקות על מנת למנוע כניסת הטיפות לתוך האף.

מנעי הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנעי/י הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחד מיון של בית-חולים, והבאי/י את אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק את התוויות והמנה **בכל פעם** שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:

יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
אין לשמור מיכלים חד פעמיים לאחר השימוש בהם.
גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום תרופה: 117 03 29566 00

היצרן: נוברטיס פארמה איי ג'י, בזל, שוויץ.

בעל הרישום: נוברטיס פארמה סרויסס איי ג'י, רח' שחם 36, פתח-תקווה.