

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

יש לקרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה.

לוראטדין טבע®

טבליות

הרכב

כל טבליה מכילה:

Loratadine 10 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Lactose monohydrate, pregelatinised starch, maize starch, magnesium stearate.

כל טבליה מכילה 62.5 מ"ג לקטוז מונוהידרט.

קבוצה תרופוטית

אנטיהיסטמינים מדור שני - נוגד רצפטור H₁.

התוויה

להקלה בתופעות אלרגיה: נזלת אלרגית, עונתית ושנתית והסימפטומים הנלווים לה: התעטשות, עקצוץ ועיניים דומעות וכן לטיפול באלרגיה של העור.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מניקה.

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך סובלת/ או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הלב, מערכת הנשימה (כגון אסטמה), הכבד או הכליה.

אזהרות

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים ללקטוז.

יש להפסיק נטילת התרופה לפחות 48 שעות לפני מבחן רגישות בעור מאחר ותוצאות הבדיקה עלולות להיות מושפעות ע"י התרופה (לבטל או להפחית תגובה חיובית למבחן).

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

לעיתים נדירות שימוש בתכשיר עלול לגרום לתחושת נמנום, שעלולה להשפיע על יכולת הנהיגה ושימוש במכוונות.

יש לעדכן כל רופא (כולל רופא שיניים) המטפל בך שהינך נוטל לוראטדין טבע.

במידה ונכנסת להריון בעת נטילת התכשיר פני להיוועץ ברופאך.

תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: יובש בפה, בחילה, נמנום, כאב ראש, עייפות או טשטוש ראייה, עצבנות, כאב בטן, עליה בתאבון.

אם תופעות אלו נמשכות או מטרידות, יש לפנות לרופא.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

יתכנו פעימות לב מהירות (נדיר): יש לפנות לרופא.

סימפטומים של פגיעה בכבד: עור ועיניים צהובים (נדיר מאוד)- במקרה זה יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד!

סימנים פתאומיים או חמורים של אלרגיה כגון פריחה עורית, גירוד, חרלת, התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון או אזורים אחרים בגוף, קוצר נשימה, צפצופים או בעיות בנשימה: הפסק/י טיפול ופנה/י לרופא מיד!

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד!

מינון

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא :
 מבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים : טבליה אחת פעם ביום. פועל תוך שעה עד 3 שעות ולמשך 24 שעות.
 אין לעבור על המנה המומלצת.
 במידה והתרופה אינה עוזרת להעלמות הסימפטומים, פנה/י לרופא.
 תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 6 שנים.
 אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה מיד כשזכרת; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.

אופן השימוש

אין ללעוס או לכתוש! ניתן לחצות את הטבליה בקו החצייה.
 לבלוע הטבליות עם מעט מים.
 יש ליטול התרופה לפני ארוחה.

מנעי/ הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
 אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.
 אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התוית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכבי/ משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור את התרופה במקום קריר ויבש מתחת ל - 25°C.
 גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
 אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 121 55 30151 00.

יצרן

טבע תעשיות פרמצבטיות חברה בע"מ,
 דברצן, הונגריה

בעל הרישום

אביק בע"מ,
 ת"ד 8077, נתניה.