

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות
ותוכנו נבדק ואושר על ידו
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו-1986
יש לקרוא בעיון את העלון עד סופו
בטרם תשתמש/י בתרופה

נורופן® טבליות/ ליקוויד קפסולות

הרכב:

כל טבליה/ליקוויד קפסולה מכילה:
Ibuprofen 200mg
כל טבליה מכילה 116.1 מ"ג סוכרוז.

מרכיבים בלתי פעילים:

טבליות:

Acacia spray dried, antifoam DC 1510, talc dihydrate, armellose sodium, macrogol 6000 powder, colloidal anhydrous silica, croscarmellose sodium, black printing ink, shellac, sodium citrate, sodium lauril sulfate, soya lecithin, stearic acid, sucrose, titanium dioxide.

ליקוויד קפסולות:

E124, gelatine, maltitol, polyethylene glycol 600, polyethylene glycol succinate, povidone, shellac, sorbitol, soya lecithin, titanium dioxide, vitamin E.

קבוצה תרפויטית

נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.

פעילות רפואית

נורופן® מיועד לשיכוך כאבים קלים עד בינוניים כגון: כאב ראש, כאבי שיניים, כאבי מחזור, כאבי גב ושירים, נוגד דלקות במחלות ראומטיות (שיגרוניות), להורדת חום.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמשי בתרופה זו כאשר הינך בהריון.
אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לתרופה או לאחד ממרכיביה, אם הייתה לך בעבר תגובה אלרגית בנטילת משכך כאבים כלשהו, אם עברת זה עתה או הינך עומד/ת לעבור ניתוח לב.
אין להשתמש בתרופה זו באם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מכיב עיכולי.
אין ליטול בו זמנית עם תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך מיניקה או אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מבעיות קיבה כגון: צרבת, כאבי בטן, בעיות בקרישת דם, יתר לחץ דם, מחלות לב וכליה, מליקוי בתפקוד מערכת הנשימה (כגון אסטמה), הכבד, זאבת אדמנתית, מחלות ברקמת החיבור, אם הינך נוטל/ת משתנים, אם הינך מעל גיל 60, אם נטילת תרופה מקבוצה זו או כל משכך כאבים אחר גרמה לתופעות לוואי חמורות.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

לאנשים מסוימים תרופה זו עלולה לגרום לנמנום, סחרחורת או טשטוש ראייה. אם חשת בתופעות אלה לאחר השימוש בתכשיר, עליך להיזהר בנהיגה ברכב או הפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות.
באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

תרופה זו עלולה לגרום לרגישות מיוחדת עם חשיפה לשמש. על כן המנע/י מחשיפה לשמש ודאגי/י להגנה מתאימה (בגדים ארוכים, כובע, תכשירי הגנה וכו').

אזהרות

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא, במקרה של טיפול ממושך בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם, שתן, תפקודי כבד, כליה ובדיקות עיניים. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

עליך לדווח לרופא אם הינך עומד/ת לעבור ניתוח (כולל ניתוח דנטאלי) או בדיקות מעבדתיות, מאחר והטיפול בתרופה עלול להשפיע על תוצאות הבדיקה.

נטילת תכשיר זה עלולה לגרום לדימומים בקיבה במיוחד אם :

- עברת גיל 60
 - הינך צורך/ת יותר מ-3 משקאות אלכוהוליים ליום.
 - הינך נוטל/ת תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
- נטילת תכשיר זה במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת, עלולה להגביר את הסיכון לשבץ מוחי או התקף לב ולדימום בקיבה.
- תרופה זו עלולה לגרום לתופעות אלרגיות כגון: פריחה עורית, גרד, שלפוחית בעור, נפיחות בפנים, קוצר נשימה, החמרה של אסטמה, הלם (שוק).
הפסק/י השימוש ופנה/י לרופא, אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם הכאבים נמשכים יותר מ-10 ימים.

תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: אספירין, סליצילטים ו/או נוגדי דלקות אחרים, תרופות נגד קרישת דם (כגון קומריין ונגזרותיו).

תרופה להורדת לחץ דם (כגון חוסמי בטא), קורטיקוסטרואידים, מתוטרקסט (לסרטן ולספחת), תרופות משתנות כגון פורוזאמיד ותיאזידים, ליתיום, פרובנציד, זידודין (לאיידס).

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: שלשול, בחילה, סחרחורת, כאבי בטן, צרבת.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

בצקת בפנים, התנפחות הלשון, הגרון, קוצר נשימה, טכיקרדיה (פעילות לב מהירה), לחץ דם נמוך, הלם (שוק) חמור (נדיר): פנה/י לרופא מיד!
הפרעות בשמיעה או בראיה, כאבים ברום הבטן, פריחה, קילוף עור, סימפטומים של דלקת קרום המוח כגון: צוואר נוקשה, כאבי ראש, בחילה, הקאות חום, צפידות וכאבים בעמוד השדרה (נדיר): פנה/י לרופא מיד!

אם הינך חש/ה עלפון, הקאה דמית, צואה דמית או שחורה: הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד!

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להיוועץ עם הרופא מיד.

מינון

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנה: 1-2 טבליות/קפסולות, לאחר מכן ובמידת הצורך 1-2 טבליות/קפסולות כל 4-6 שעות.

אין ליטול יותר מ-6 טבליות/קפסולות במשך 24 שעות.

אין ליטול מעל למנה המומלצת.

יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר המשיגה את מטרת השימוש.

השימוש בילדים מתחת לגיל 12 שנה יהיה בפקוח רפואי.

להפגת כאבי מחזור יש להתחיל בטיפול מיד עם הופעת הכאבים.

אופן השימוש

טבליות:

אין ללעוס, לכתוש או לחצות את הטבליה! לבלוע התרופה עם מים.
יש ליטול התרופה עם או אחרי ארוחה.

ליקוויד קפסולות:

לבלוע התרופה עם מים.
יש ליטול התרופה עם או אחרי ארוחה.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.

אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטלת תרופה.
הרכבי/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

אין לאחסן מעל-25°C.

גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה:

טבליות: 132 32 31025 00

ליקוויד קפסולות: 127 55 30584 00

יצרן: רקיט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ, נוטינגהם, אנגליה.

בעל הרישום: רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ.

רח' הסדנאות 10, הרצליה.

סימוכין: 35348