

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(כתשירים רפואיים) התשמ"ו – 1986**

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

סטרפסילס® פלוס

24 לכסניות למציצה

הרכב:

כל לכסנית מכילה:

2,4-Dichlorobenzyl Alcohol 1.2 mg

Amylmetacresol 0.6 mg

Lidocaine Hydrochloride 10.0 mg

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת למבוגרים ולילדים מעל לגיל 12. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

להקלה מהירה בכאבי גרון חזקים ולחיטוי הגרון.

קבוצה תרופתית: אנטיספט.

2. לפני השימוש בתרופה

✘ אין להשתמש בתרופה אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- לפני הטיפול בסטרפסילס פלוס ספרי לרופא אם הינך בהריון או מיניקה.
- אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת בלי היוועץ ברופא.

הריון והנקה

אם הינך בהריון או מיניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בסטרפסילס פלוס.

ל התרופה ומזון

- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

ל מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

כל לכסנית מכילה 2 מ"ג סודיום סכרוין, כמות מיריבת של סודיום סכרוין ביום היא 5 מ"ג לקי"ג משקל גוף.
הלכסניות מכילות סוכר ואינן מומלצות לשימוש בחולי סוכרת.

3. כיצד תשתמש בתרופה

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל למבוגרים וילדים מעל לגיל 12 שנה הוא: לכסנית אחת למציצה כל 2-3 שעות לפי הצורך.

אין להשתמש ביותר מ- 8 לכסניות ביממה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

התרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 12 שנה. כאב גרון, חמור, ממושך או המלווה בחום, כאב ראש, בחילה והקאות, מחייב התייעצות מיידית עם הרופא.

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לחדר מינון של בית חולים, והבא ארזית התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים או הנך זקוק להם.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסטרפסילס פלוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעה פריחה או גירוי מקומי (נדיר).

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם Tartaric Acid, Sodium Saccharin, Levomenthol, Peppermint Oil, Star Anise Oil, Indigo Carmine, Quinoline Yellow, Solids from Liquid Sucrose and Liquid Glucose.
- כל לכסנית מכילה 2 מ"ג סודיום סכרוין.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארזיה: ארזיות הקרטון מכילה 24 לכסניות. הלכסניות הינן עגולות, בצבע כחול בהיר.
- בעל הרישום:** רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ, רח' הנגר 6, הוד השרון 45240.
- יצרן:** רקיט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ, נוטינגהם, אנגליה.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: יולי 2012.
- מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 106.86.28928
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

STRE PLU LOZ PL SH 161012